

VALIDATION DES DOSES

Adaptation du tableau du CSS¹ sur la validation des doses dans le cadre du Programme de vaccination de la FW-B

DOSE A VALIDER	Age minimum pour cette dose	Intervalle minimum pour la dose suivante
DTPa-VHB-IPV-Hib 1	6 semaines	4 semaines
DTPa-VHB-IPV-Hib 2	10 semaines	4 semaines
DTPa-VHB-IPV-Hib 3	14 semaines	6 mois
DTPa-VHB-IPV-Hib 4 ²	50 semaines	
DTP-IPV 1 ou DTP 1 ou IPV 1	6 semaines	4 semaines
DTP-IPV 2 ou DTP 2 ou IPV 2	10 semaines	4 semaines
DTP-IPV 3 ou DTP 3 ou IPV3	14 semaines	6 mois
DTP-IPV 4 ou DTP 4	50 semaines	6 mois
DTP-IPV 5 ou DTP 5	//	//
DTP 6 ou dTp ou DT ou dT	12 ans	//
Hib 1	6 semaines	4 semaines
Hib 2	10 semaines	4 semaines
Hib 3	14 semaines	8 semaines
Hib 4	50 semaines	
VHB 1	Naissance	4 semaines
VHB 2	4 semaines	8 semaines
VHB 3	24 semaines	
VHB 1 et VHB 3		16 semaines
RRO 1	12 mois ³	4 semaines
Méningocoques AWCY	12 mois	

¹ Conseil Supérieur de la Santé - Vaccination de rattrapage, Avis n°9111

² En cas de schéma en 3 doses, consulter les dernières lignes du tableau pour la validation des doses.

³ Dans le cadre du Programme, 12 mois est la limite minimum pour considérer la première dose de RRO comme valable et non 50 semaines comme indiqué par le CSS.

PnCV13-1	6 semaines	4 semaines
PnCV13-2	10 semaines	8 semaines
PnCV13-3 ⁴	50 semaines	
Rotavirus 1	6 semaines	4 semaines
Rotavirus 2	10 semaines	4 semaines
Rotavirus 3	14 semaines	
HPV 1	9 ans	5 mois
HPV 2	9 ans + 5 mois	
Hépatite A dose 1	12 mois	6 mois
Hépatite A dose 2	18 mois	
Varicelle 1 ⁵	12 mois	12 semaines
Varicelle 2 ⁶	15 mois	
Méningocoque B 1 ⁷	2 mois	8 semaines
Méningocoque B 2	4 mois	6 mois
Méningocoque B 3	12 mois	
En cas de schéma 2+1 ⁸		
DTPa-VHB-IPV-Hib 1 ou DTPa-IPV 1	6 semaines	8 semaines
DTPa-VHB-IPV-Hib 2 ou DTPa-IPV 2	14 semaines	6 mois
DTPa-VHB-IPV-Hib 3 ou DTPa-IPV 3	11 mois	

⁴ Si le vaccin utilisé est le Prévenar 20®, le schéma de vaccination comporte 4 doses (8 semaines, 16 semaines, 24 semaines et 1 an).

⁵ Ce vaccin peut s'administrer dès l'âge de 9 mois en cas d'épidémie, mais cette dose ne sera pas comptabilisée (dose 0). La dose 1 devra être faite 3 mois plus tard.

⁶ Idéalement trois mois, mais un intervalle d'un mois est aussi accepté. Des intervalles plus longs sont aussi possibles/acceptés.

⁷ Les doses de méningocoques B du tableau correspondent à une vaccination démarrée entre 2 et 5 mois et avec un schéma 2+1.

⁸ Dans son avis de 2013, le CSS ne donne pas d'indication sur la validation des doses reçues lors de l'administration d'un schéma 2+1, l'âge indiqué ici se base sur les schémas pratiqués à l'étranger (France, Italie, Espagne, etc.).