VALIDATION DES DOSES

Adaptation du tableau du CSS[1] sur la validation des doses dans le cadre du Programme de vaccination de la FW-B

DOSE A VALIDER	Age minimum pour cette dose	Intervalle minimum pour la dose suivante
DTPa-VHB-IPV-Hib 1	6 semaines	8 semaines
DTPa-VHB-IPV-Hib 2	14 semaines	6 mois
DTPa-VHB-IPV-Hib 3[2]	11 mois	
DTP-IPV 1 ou DTP 1 ou IPV 1	6 semaines	8 semaines
DTP-IPV 2 ou DTP 2 ou IPV2	14 semaines	6 mois
DTP-IPV 3 ou DTP 3	11 mois	
Hib 1	6 semaines	8 semaines
Hib 2	14 semaines	6 mois
Hib 3	11 mois	
VHB 1	Naissance	4 semaines
VHB 2	4 semaines	8 semaines
VHB 3	24 semaines	
VHB 1 et VHB 3		16 semaines
RRO 1	50 semaines	4 semaines
Méningocoques AWCY	12 mois	
PnCV13-1	6 semaines	4 semaines
PnCV13-2	10 semaines	8 semaines
PnCV13-3[3]	50 semaines	
Rotavirus 1	6 semaines	4 semaines

[1] Conseil Supérieur de la Santé - Vaccination de rattrapage, Avis n°9111 ; voir aussi l'avis 9761 « Calendrier vaccinal de base (2025)

[2] En cas de schéma en 4 doses, consulter les dernières lignes du tableau pour la validation des doses.

[3] Si le vaccin utilisé est le Prévenar 20®, le schéma de vaccination comporte 4 doses (8 semaines, 16 semaines, 24 semaines et 1 an).

Editeur responsable : ONE - Chaussée de Charleroi 95, 1060 Bruxelles - Novembre 2026

Rotavirus 2	10 semaines	4 semaines
Rotavirus 3	14 semaines	
HPV 1	9 ans	5 mois
HPV 2	9 ans + 5 mois	
Hépatite A dose 1	12 mois	6 mois
Hépatite A dose 2	18 mois	
Varicelle 1[4]	12 mois	12 semaines
Varicelle 2[5]	15 mois	
Méningocoque B 1[6]	2 mois	8 semaines
Méningocoque B 2	4 mois	6 mois
Méningocoque B 3	12 mois	
En cas de schéma 3+1		
DTPa-VHB-IPV-Hib 1	6 semaines	4 semaines
DTPa-VHB-IPV-Hib 2	10 semaines	4 semaines
DTPa-VHB-IPV-Hib 3	14 semaines	6 mois
DTPa-VHB-IPV-Hib 4	50 semaines	

[4] Ce vaccin peut s'administrer dès l'âge de 9 mois en cas d'épidémie, mais cette dose ne sera pas comptabilisée (dose 0). La dose 1 devra être faite 3 mois plus tard (à partir de 12 mois)
[5] Idéalement trois mois, mais un intervalle d'un mois est aussi accepté. Des intervalles plus longs sont aussi possibles/acceptés.
[6] Les doses de méningocoques B du tableau correspondent à une vaccination démarrée entre 2 et 5 mois et avec un schéma 2+1.

Editeur responsable : ONE - Chaussée de Charleroi 95, 1060 Bruxelles - Novembre 2026