SCHÉMA DE RATTRAPAGE

Pour les enfants de 2 mois à 6 ans dans le cadre du Programme de vaccination de la FW-B
Tableau adapté des recommandations du CSS

		Intervalle minimal		
Nom du vaccin	**Vaccination**	**Doses 1 et 2**	**Doses 2 et 3**	**Âge minimum pour dose 3**
Vaxelis®[1]	**DTPa-IPV-Hib-HB**	8 semaines	6 mois	12 mois
(Infanrix-IPV®[2])	**DTPa-IPV**	8 semaines	6 mois	12 mois
(Imovax®[2])	**Polio**	8 semaines	6 à 12 mois	
MMR-Vax-Pro®	**RRO**	1 dose à partir de 12 mois		
Nimenrix®	**Men ACWY**	1 dose à partir de 15 mois[3]		
Prévenar 13®[4]	**PnCV**	Si la dose 1 est administrée avant l'âge de 10 mois, la dose 2 est administrée à un intervalle de 8 semaines, et la dose 3 à l'âge de 12 mois et au moins 8 semaines après la 2ème dose		
		Si la dose 1 est administrée à l'âge de 10 ou 11 mois, la dose 2 est administrée à partir de l'âge de 12 mois et au moins 8 semaines après la première dose		
		Si la dose 1 est administrée entre 12 et 24 mois ou si l'enfant est âgé de plus de 24 mois, pas de dose supplémentaire		
Rotarix®/ Rotateq®	**Rotavirus**	Même en cas d'administration tardive (de préférence avant 16 semaines), la dernière dose ne peut être administrée après l'âge de 24 ou 32 semaines (suivant le vaccin) (voir fiche vaccination contre le rotavirus)		

[1] Le Vaxelis® peut être utilisé pour les vaccinations jusqu'à l'âge de 10 ans inclus.

[2] Infanrix-IPV® ou Imovax® administré à la place du Vaxelis® si les parents ne souhaitent la vaccination hexavalente.

[3] Le vaccin peut être administré dès 12 mois.

[4] PnCV : le vaccin antipneumococcique conjugué Prevenar 13® sera administré au-delà de 24 mois uniquement chez les enfants présentant un risque fortement accru d'infection invasive (voir fiche pneumocoque dans l'avis du CSS).

Editeur responsable : ONE - Chaussée de Charleroi 95, 1060 Bruxelles - Novembre 2026

SCHÉMA DE RATTRAPAGE

Pour les enfants de 7 à 18 ans dans le cadre du Programme de vaccination de la FW-B

		Intervalle minimal	
Nom du vaccin	**Vaccination**	**Doses 1 et 2**	**Doses 2 et 3**
Vaxelis®	**DTPa-IPV-Hib-HB**	8 semaines	6 mois
Infanrix-IPV® Boostrix®[1]	**DTPa-IPV ou dTpa[1]**	8 semaines	6 mois
Imovax®[2]	**Polio**	8 semaines	6 à 12 mois
Engerix-B 20® (adulte)	**Hépatite B entre 11 et 15 ans**	6 mois	
Engerix-B 20® (adulte)	**Hépatite B à partir de 16 ans**	4 semaines	6 mois
Gardasil 9®[3]	**HPV**	5 mois	
MMR-Vax-Pro®[3]	**RRO**	4 semaines	

Il n'est pas nécessaire d'administrer la dose DTPa-IPV recommandée à l'âge de 5-6 ans si une dose de DTPa-IPV a été donnée après l'âge de 4 ans. De plus, si le rappel dTpa est administré à l'âge de 12 ans ou plus tard, il n'est pas nécessaire de donner le rappel recommandé à 15-16 ans.

Il est recommandé de réaliser un rappel tous les 10 ans de la vaccination Diphtérie-Tétanos-Coqueluche.

[1] DTPa-IPV (Infranrix-IPV®) jusqu'à 12 ans inclus ; dTpa (Boostrix) à partir de 13 ans.

[2] Indisponible dans le cadre du marché d'achat et de livraison des vaccins mis en place par le Programme de vaccination de la FW-B.

[3] Ces vaccins peuvent être désormais administrés le même jour lors de la réalisation d'un rattrapage.

Editeur responsable : ONE - Chaussée de Charleroi 95, 1060 Bruxelles - Novembre 2026