



## MALADIES PRÉVENUES

- Infections génitales au Papillomavirus Virus Humain

## CALENDRIER

- 13- 14 ans ou 2<sup>ème</sup> secondaire en PSE
- 6 mois d'écart entre les deux doses

## VALIDATION D'UN SCHEMA

- 2 doses
- Âge min première dose : 9 ans
- Écart min entre les doses : 5 mois

## RATTRAPAGE

- Jusqu'à 18 ans : 2 doses à 6 mois d'intervalle.
- À partir de 19 ans : 3 doses selon le schéma : 0, 1-2 et 6 mois (3 doses à administrer en moins d'un an)

## ADMINISTRATION

- Intramusculaire
- Deltoïde

## CARACTÉRISTIQUES

- Inactivé (recombiné)
- Conservation entre +2 à +8°C
- Suspension injectable

## CONTRE-INDICATIONS

- Allergie à un des composants du vaccin (voir notice)
- Grossesse

## VACCIN DU PROGRAMME FW-B

## GARDASIL 9®

- Jusqu'à 18 ans inclus ou 4<sup>ème</sup> secondaire en PSE

## CO-ADMINISTRATION

- Trivalent dTpa
- Poliomyélite
- RRO
- Hépatite B

## EFFETS INDÉSIRABLES

- **TRÈS FRÉQUENTS**  
Réactions locales au site d'injection (douleur, érythème, œdème)
- **FRÉQUENTS**  
Vertiges, céphalées, nausées, fièvre, fatigue
- **PEU FRÉQUENTS À RARES**  
Arthralgie, myalgie, urticaire, asthénie, malaise, syncope parfois avec mouvements tonico-cloniques, frissons, nodule au site d'injection, lymphadénopathie
- **TRÈS RARES**  
Réactions anaphylactiques (1 cas par 1,7 millions de doses selon l'OMS)

## COMMANDE DU VACCIN VIA E-VAX

Les vaccins du **Programme de vaccination de la FW-B** peuvent être commandés **gratuitement** par tout professionnel vaccinateur sur la plateforme **e-vax** (accessible via le site [vaccination-info.be/pro](http://vaccination-info.be/pro)). Une inscription est nécessaire pour commander et encoder les données de vaccination.

Les vaccins prescrits et délivrés en pharmacie ne rentrent pas dans le cadre du Programme de vaccination. Ils ne seront que partiellement remboursés selon la mutuelle du patient.



Plus d'infos  
sur la page HPV du site :  
[www.vaccination-info.be/pro](http://www.vaccination-info.be/pro)