

**REMARQUE :**

Depuis 2025, le CSS recommande une vaccination avec le PCV20. Ceci n'est pas encore d'application dans le Programme qui a un PCV13 et c'est ce dernier qui est abordé dans cette fiche.

MALADIES PRÉVENUES

- Infections invasives à *Streptococcus pneumoniae*

CALENDRIER

- 2 mois
- 3 mois (dose supplémentaire pour les prématurés <37 semaines)
- 4 mois
- 12 mois

ADMINISTRATION

- Intramusculaire
- Face antérolatérale de la cuisse ou deltoïde

**VACCIN DU PROGRAMME
FW-B****PREVENAR 13®**

- Rattrapage possible jusqu'à 24 mois

COMMANDE DU VACCIN VIA E-VAX

Les vaccins du **Programme de vaccination de la FW-B** peuvent être commandés **gratuitement** par tout professionnel vaccinateur sur la plateforme **e-vax** (accessible via le site vaccination-info.be/pro). Une inscription est nécessaire pour commander et encoder les données de vaccination.

Les vaccins prescrits et délivrés en pharmacie ne rentrent pas dans le cadre du Programme de vaccination. Ils ne seront que partiellement remboursés selon la mutuelle du patient.

VALIDATION D'UN SCHÉMA

- 2+1 (ou 3+1 si prématurés)
- **Âge min première dose** : 6 semaines
- **Écart et âge min des doses** :
 - » *Entre 1 et 2* : écart 8 semaines (schéma 2+1) ou écart 4 semaines (schéma 3+1)
 - » *Entre 2 et 3* : écart 8 semaines et âge min 12 mois pour la dose 3 (schéma 2+1)
 - » *Entre 3 et 4* : écart 8 semaines et âge min 12 mois pour la dose 4 (schéma 3+1)

CARACTÉRISTIQUES

- Vaccin pneumococcique polysidique conjugué
- Conservation entre +2 à +8°C
- Suspension injectable

CO-ADMINISTRATION

- Hexavalent
- Méningocoques
- RRO
- Rotavirus

RATTRAPAGE

- **Dose 1 avant 10 mois** : Dose 2 à 8 semaines, dose 3 à 12 mois et ≥ 8 semaines après la dose 2
- **Dose 1 à 10–11 mois** : Dose 2 à partir de 12 mois et ≥ 8 semaines après la dose 1
- **Dose 1 entre 12 et 24 mois** : Aucune dose supplémentaire
- **Âge ≥ 24 mois** : Plus recommandé

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie à un des composants du vaccin (voir notice)

EFFETS INDÉSIRABLES

- **TRÈS FRÉQUENTS**
Réactions locales au site d'injection (douleur, érythème, œdème), irritabilité, fièvre, perte d'appétit, somnolence, sommeil perturbé
- **FRÉQUENTS**
Fièvre > 39 °C, nausées, diarrhées, vomissements
- **PEU FRÉQUENTS À RARES**
Urticaire, éruption cutanée, pleurs, convulsions y compris fébriles, épisode d'hypotonie-hyporéactivité, réaction d'hypersensibilité dont œdème facial, dyspnée, bronchospasme



Plus d'infos sur la page
Pneumocoques du site :

www.vaccination-info.be/pro