

## RATTRAPAGE AVEC PCV20

À suivre chez un enfant en bonne santé de moins de 5 ans avec schéma incomplet de PCV13 ou 10

Tableau issu de l'avis du CSS et traduit en français.

Âge	Nombre de doses PCV13 (ou 10) déjà reçues	Doses de PCV20 requises (8 semaines d'intervalle minimum entre les doses)
2 à 6 mois	0	4 doses suivant recommandations (3+1)
	1	3 doses : dernière entre 12 -15 mois
	2	2 doses : dernière entre 12-15 mois
7 à 11 mois	0	3 doses : 2 doses initiales, troisième dose à partir 12 mois
	1 (peu importe l'âge) ou 2 avant 7 mois	2 doses : la seconde à partir de 12 mois
	2 à 7 mois ou plus	1 dose entre 12 et 15 mois, au moins 8 semaines après la dose la plus récente
12 à 23 mois	0	2 doses : intervalle de 8 semaines entre elles et au moins 8 semaines après la dose la plus récente
	1 avant 12 mois	
	2 avant 12 mois	1 dose au moins 8 semaines après la dose la plus récente
	1 à partir de 12 mois	
24 à 59 mois	0 ou 1 ou 2 avant 12 mois	1 dose au moins 8 semaines après la dose la plus récente
	1 entre 12 et 24 mois	
	1 au-delà de 24 mois	Pas de dose supplémentaire