



13/14
ans

À CHAQUE ÂGE SA VACCINATION !

La vaccination à 13-14 ans

Programme de vaccination
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

édition
2026

Pourquoi vacciner ?

➤ Pour se protéger contre certaines maladies.

Les vaccins proposés dans le Programme de vaccination contiennent des fragments d'un virus ou d'une bactérie, ou une faible quantité de ceux-ci tués ou affaiblis.

Grâce aux vaccins, le système immunitaire se prépare à les reconnaître et à les combattre. S'il les rencontre encore une fois, il pourra plus facilement les neutraliser.

➤ Pour protéger les autres contre certaines maladies.

Quelques personnes ne peuvent pas être vaccinées : nourrissons trop jeunes, personnes pour lesquelles cela est médicalement contre-indiqué.

Plus il y a de personnes vaccinées contre une maladie, moins le virus ou la bactérie circulent dans la population, ce qui protège notamment les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.

Des réactions sont-elles possibles ?

Certains effets indésirables sont possibles.

Ils sont généralement **sans gravité** : rougeurs, légère douleur à l'endroit où l'injection du vaccin est faite et fièvre, nausées, vertiges, maux de tête de courte durée.

Ces réactions disparaissent après quelques jours au maximum.

Pour plus d'**informations**, consultez votre **médecin traitant** ou le site : www.vaccination-info.be



Calendrier de vaccination 2026-2027

		Nourrissons					Enfants et adolescents			
		8 sem. (2 mois)	12 sem. (3 mois)	16 sem. (4 mois)	12 mois	15 mois	5-6 ans	7-8 ans	13-14 ans	15-16 ans
Poliomyélite	Hexavalent									
Diphtérie							✓			✓
Tétanos		✓	✓	✓		✓				
Coqueluche										
<i>Haemophilus influenza</i> de type b										
Hépatite B										
Rougeole	RRO				✓			✓		
Rubéole										
Oreillons										
Méningocoques ACWY						✓				✓
Pneumocoque		✓	(✓)	✓	✓					
Rotavirus (vaccin oral)		✓	✓	(✓)						
Papillomavirus (HPV)									✓✓	①



Recommandé à tous et gratuit



Recommandé à tous, remboursé mais pas gratuit



Recommandé à tous, partiellement remboursé selon la mutuelle



Vaccin combiné (une seule injection)



Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart)

Hexavalent : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies.

Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans.
Il peut éventuellement être adapté à votre enfant, parlez-en avec votre médecin.

Quels vaccins sont recommandés à 13-14 ans ?

Une vaccination en 2 doses contre le **papillomavirus humain** (HPV) pour tous les jeunes inscrits en 1^{ère} différenciée, 2^{ème} secondaire ou âgés de 13-14 ans dans l'enseignement spécialisé.



En retard de vaccination ?

Rattrapage disponible pour tous les jeunes n'ayant pas encore reçu les 2 doses de vaccin contre la rougeole-rubéole-oreillons (RRO).
Rattrapage disponible pour tous les jeunes qui ne sont pas vaccinés contre l'hépatite B.

A NOTER :

La vaccination concerne les filles et les garçons.

EN PRATIQUE

Qui peut vacciner ?

- Votre **médecin traitant** ;
- L'**équipe de Promotion de la Santé à l'École** ;
L'équipe vérifie le statut vaccinal des élèves à chaque bilan de santé. Selon les âges, elle peut proposer une vaccination prévue dans le calendrier vaccinal ou un rattrapage ; ou vous proposer de prendre contact avec votre médecin traitant.
- L'équipe du **planning familial**.

Qu'allez-vous payer ?

- **Les vaccins sont gratuits et fournis directement par le professionnel de santé** qui doit les commander auprès du Programme de vaccination. **Il ne faut pas l'acheter en pharmacie.**
- D'éventuels **frais de consultation** chez le médecin traitant sont **à votre charge**.
- **Vous n'avez aucun frais** dans le cadre de la Promotion de la Santé à l'Ecole.





FOCUS

Le papillomavirus humain (HPV)

- > Le HPV est un **virus** qui se décline en différents types. Il en existe plus d'une centaine.
- > Près de 80% de la population est infectée au cours de sa vie par un type de virus HPV. La plupart l'élimineront naturellement et ne développeront pas de complication.
- > Certains types peuvent entraîner des infections au niveau des organes génitaux, de l'anus ou de la gorge. Ces infections peuvent évoluer en **cancer** (col de l'utérus, vulve, vagin, pénis, anus, bouche-pharynx). Environ 20% des cancers se déclarent chez l'homme. Les types HPV16 et 18 sont les plus dangereux et les plus fréquents.
- > D'autres types HPV sont responsables de **verrues génitales**.
- > Le HPV se transmet lors des relations sexuelles ou lors de caresses intimes. La vaccination est préconisée, même après le début de la vie sexuelle et jusqu'à 26 ans.
- > Le préservatif ne protège pas totalement contre une infection transmise par le HPV.
- > La vaccination ne protège pas contre tous les types de virus HPV. Pour les filles, la prévention du cancer nécessite toujours un dépistage par **frottis**.

Pour plus d'informations,
consultez votre médecin traitant ou le site :
www.vaccination-info.be

@-vax

Le système de commande de vaccins et d'encodage des données vaccinales, utilisé par les vaccinateurs dans le cadre du Programme de vaccination, se nomme e-vax.

Ce système permet d'enregistrer les dates de vaccination et de constituer le registre vaccinal permettant le suivi de votre vaccination. Les données sont gérées dans le respect de la loi relative à la protection de la vie privée.

Si vous ne souhaitez pas que vos données vaccinales soient encodées, informez-en votre vaccinateur.