02/15 mois

À CHAQUE ÂGE SA VACCINATION !

La vaccination entre 2 et 15 mois

NOUVEAU CALENDRIER VACCINAL

Programme de vaccination
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

édition 2026

Pourquoi vacciner ?

- **Pour se protéger contre certaines maladies.**

  Les vaccins proposés dans le Programme de vaccination contiennent des fragments d'un virus ou d'une bactérie, ou une faible quantité de ceux-ci tués ou affaiblis.

  Grâce aux vaccins, le système immunitaire se prépare à reconnaitre et à combattre ces microbes. S'il les rencontre par la suite, il pourra plus facilement les neutraliser.

- **Pour protéger les autres contre certaines maladies.**

  Quelques personnes ne peuvent pas être vaccinées : nourrissons trop jeunes, personnes pour lesquelles cela est médicalement contre-indiqué.

  Plus il y a de personnes vaccinées contre une maladie, moins le virus ou la bactérie circulent dans la population, ce qui protège notamment les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.

Des réactions sont-elles possibles ?

Certains effets indésirables sont possibles.
Ils sont généralement sans gravité : rougeurs, gonflement et/ou douleurs à l'endroit de l'injection du vaccin, fièvre et irritabilité.
Ces réactions disparaissent après quelques jours au maximum.

CALENDRIER DE VACCINATION

2026-2027

		Naissance	Nourrissons					Enfants et adolescents			
			8 sem. (2 mois)	12 sem. (3 mois)	16 sem. (4 mois)	12 mois	15 mois [1]	5-6 ans	7-8 ans	13-14 ans	15-16 ans
Poliomyélite	Hexavalent		✓		✓	✓		✓			✓
Diphtérie	Hexavalent		✓		✓	✓		✓			✓
Tétanos	Hexavalent		✓		✓	✓		✓			✓
Coqueluche	Hexavalent		✓		✓	✓		✓			✓
Haemophilus influenza de type b	Hexavalent		✓		✓	✓		✓			✓
Hépatite B	Hexavalent		✓		✓	✓		✓			✓
Rougeole	RRO					✓			✓		
Rubéole	RRO					✓			✓		
Oreillons	RRO					✓			✓		
Méningocoques ACWY							✓				✓
Pneumocoques			✓	✓ [1]	✓		✓				
Rotavirus (vaccin oral)			✓	✓	✓ [2]						
Virus respiratoire syncytial (VRS)		✓ [3]		✓							
Papillomavirus (HPV)										✓ ✓	

[1] Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, une dose supplémentaire de vaccin contre les pneumocoques est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15 mois seront administrés à 13 mois (pneumocoques et méningocoques ACWY).

[2] En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.

[3] Deux options sont possibles, la vaccination de la femme enceinte entre 28 et 36 semaines de grossesse (si la date du terme se situe entre septembre et janvier) ; ou l'immunisation du nourrisson juste avant ou en cours de saison VRS, en fonction de sa date de naissance.

- ✓ Recommandé à tous et gratuit
- ✓ Recommandé à tous, remboursé mais pas gratuit
- ✓ Recommandé à tous, partiellement remboursé selon la mutuelle
- Vaccin combiné (une seule injection)

Hexavalent : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies

Plusieurs vaccinations sont recommandées dès 2 mois :

- La vaccination hexavalente
- La vaccination contre les pneumocoques
- La vaccination contre les méningocoques
- La vaccination contre rubéole, rougeole, oreillons (RRO)
- La vaccination contre le rotavirus

Afin d'assurer une protection optimale grâce à la vaccination, il est important de respecter au mieux le calendrier vaccinal recommandé et de vacciner aux moments prévus.

Pour plus d'informations, parlez-en avec votre médecin ou consultez le site : **www.vaccination-info.be**

EN PRATIQUE

Qui peut vacciner ?

- La consultation pour enfants 0-6 ans de l'ONE
- Une consultation pédiatrique hospitalière
- Votre médecin traitant
- Votre pédiatre

Qu'allez-vous payer ?

- Les **vaccins inclus dans le Programme sont gratuits** et fournis directement par le professionnel de santé qui participe au Programme de vaccination. **Il ne faut pas les acheter en pharmacie (à l'exception du vaccin contre le Rotavirus).**
- Si les vaccins sont commandés par votre professionnel de santé, seuls les éventuels **frais de consultation** sont à votre charge.
- Vous n'aurez aucun frais en consultation pour enfant 0-6 ans de l'ONE.

e-vax

Le système de commande de vaccins, et d'encodage des données vaccinales, utilisé par les vaccinateurs dans le cadre du Programme, se nomme e-vax. Ce système permet d'enregistrer les dates de vaccination et de constituer le registre vaccinal permettant le suivi de vos vaccinations. Les données sont gérées dans le respect du Règlement général sur la protection des données. Si vous ne souhaitez pas que vos données vaccinales soient encodées dans le registre, informez-en votre vaccinateur.

FOCUS SUR DEUX MALADIES

La coqueluche :

- La coqueluche est une maladie **très contagieuse**, transmise par voie aérienne. Elle est causée par une bactérie.
- La maladie est **particulièrement sévère** chez les **nourrissons** car elle entraine des **arrêts respiratoires** et peut être **mortelle** dans les premiers mois de vie.
- Les complications de la maladie sont : otite, pneumonie, convulsions, encéphalite, hernie ou fracture de côtes suite aux quintes de toux.

La rougeole :

- La rougeole est une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Elle est causée par un virus.
- La rougeole met entre 7 à 14 jours avant de se déclarer. Les symptômes sont : nez qui coule, yeux enflammés, suivis très rapidement d'une forte fièvre, de l'apparition de taches rouges sur la peau, d'un mal-être général et de toux.
- Elle peut toucher tout le monde et donner lieu à des complications sévères, tant chez les enfants que chez les adultes, dans près de 40% des cas.
- Les complications peuvent survenir au niveau du système respiratoire ou neurologique (pneumonies, bronchites, otites, encéphalite) et sont parfois mortelles.
- Les antibiotiques ne sont d'aucune utilité pour combattre la rougeole sauf pour traiter les éventuelles complications.

Pour plus d'informations,
consultez votre médecin traitant ou le site :
www.vaccination-info.be

ONE
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

VACCINATION-INFO.BE

E.R. : ONE • Chaussée de Charleroi 95 • 1060 Bruxelles • +32 (0)2 542 12 11 • info@one.be
D/2026/74.80/03 • SAP 2038