


NOUVEAU CALENDRIER VACCINAL DES NOURRISSONS

Repères pratiques pour appliquer les schémas à partir du 1^{er} novembre 2026

À partir du 1^{er} novembre 2026, le calendrier vaccinal des nourrissons évolue. Ce dossier synthétise les changements, les règles de transition et les points de vigilance pour sécuriser les schémas en cours.



En un coup d'œil

Le **vaccin hexavalent** passe de 4 à 3 doses, administrées à 2, 4 et 12 mois.

La dose de **PCV13** prévue à 12 mois est déplacée à 15 mois. Le PCV13 reste le vaccin antipneumococcique proposé par le Programme de vaccination.

Pourquoi le calendrier change-t-il ?

Le Conseil Supérieur de la Santé a révisé ses recommandations afin de simplifier le calendrier tout en maintenant une protection optimale. Le Programme de vaccination met en œuvre un schéma hexavalent 2+1 et réorganise le schéma du PCV13 afin d'éviter trois injections lors de la visite des 12 mois.

Le nouveau schéma pour les nourrissons

Vaccination	Ancien schéma	Nouveau schéma	Changement
Hexavalent	2, 3, 4 et 15 mois	2, 4 et 12 mois	Suppression de la dose à 3 mois et rappel avancé à 12 mois
Pneumocoques PCV13	2, 4 et 12 mois	2, 4 et 15 mois	Dernière dose déplacée de 12 à 15 mois
RRO	12 mois	12 mois	Pas de changement
Méningocoques ACWY	15 mois	15 mois	Pas de changement


Le passage au schéma hexavalent 2+1 représente le nouveau schéma recommandé. L'intervalle minimal entre la première et la deuxième dose doit être de 8 semaines minimum.

Comment gérer la période de transition ?

Avant de planifier la dose suivante, vérifiez toujours l'âge de l'enfant, le nombre de doses déjà reçues et l'intervalle entre les doses. Le tableau ci-dessous concerne la vaccination hexavalente.

Situation au 1/11/2026	Schéma à poursuivre	Conduite pratique
Schéma non commencé	Schéma 2+1	Administrer à 2, 4 et 12 mois
Une seule dose reçue	Schéma 2+1	Administrer la 2 ^{ème} dose au moins 8 semaines après la 1 ^{ère} , puis le rappel à partir de 12 mois et au moins 6 mois après la primovaccination
Deux doses espacées d'au moins 8 semaines	Schéma 2+1	Administrer le rappel à partir de 12 mois et au moins 6 mois après la dernière dose
Deux doses espacées d'un mois	Poursuite du schéma 3+1	Administrer la 3 ^{ème} dose selon le schéma engagé, puis le rappel à 12 mois, en respectant un minimum de 6 mois après la primovaccination
Trois doses reçues	Poursuite du schéma 3+1	Administrer le rappel à 12 mois, au moins 6 mois après la primovaccination
Enfant âgé de 12 à 15 mois au moment du changement et ayant reçu 3 doses	Maintien du schéma engagé	Administrer le rappel hexavalent dès qu'il est vu en consultation ou, par défaut, à 15 mois

À vérifier avant chaque injection :



Vaccination contre les pneumocoques

Pour tous les nourrissons de moins de 12 mois, la dernière dose de PCV13 est prévue à 15 mois au lieu de 12 mois.

Pour les enfants de plus de 12 mois ayant déjà reçu la dose prévue, aucune action supplémentaire n'est requise.

Le PCV13 reste le vaccin du Programme de vaccination. Le passage au PCV20 n'est pas mis en œuvre à ce stade et est en cours d'analyse.

Cas particulier : nourrissons nés avant 37 semaines

Schéma spécifique : Une dose supplémentaire de vaccin contre les pneumocoques est recommandée à 3 mois. Les vaccinations normalement prévues à 15 mois, pneumocoques et méningocoques ACWY, sont administrées à 13 mois.

Les erreurs à éviter

- Continuer automatiquement à administrer l'hexavalent à 3 mois sans vérifier si l'enfant relève du nouveau schéma.
- Programmer le rappel hexavalent à 12 mois sans respecter l'intervalle minimal requis après la primovaccination.

- Administrer systématiquement une dose supplémentaire lorsqu'un enfant a commencé l'ancien schéma. La conduite dépend de l'historique et des intervalles.
- Appliquer le schéma standard à un enfant né avant 37 semaines sans tenir compte des recommandations particulières.
- Ne pas mettre à jour le rendez-vous suivant et l'information donnée aux parents après l'injection.

Repère par âge

Âge	Hexavalent	Pneumocoques PCV13	Autres repères
2 mois	Dose 1	Dose 1	Rotavirus selon le vaccin utilisé
3 mois	Pas de dose	Dose supplémentaire si naissance avant 37 semaines	Rotavirus selon le vaccin utilisé
4 mois	Dose 2	Dose 2	Rotavirus selon le vaccin utilisé
12 mois	Rappel	Pas de dose	RRO
13 mois	Selon historique uniquement	Dose finale si naissance avant 37 semaines	Méningocoques ACWY si naissance avant 37 semaines
15 mois	Selon transition uniquement	Dose finale en routine	Méningocoques ACWY

En cas de doute


Ne vous basez pas uniquement sur l'âge. Reconstituez l'historique, vérifiez les intervalles et utilisez les outils professionnels de validation des doses et de rattrapage mis à disposition par le Programme de vaccination.

Informer les parents


Expliquez que le calendrier a été réorganisé : une injection hexavalente en moins est prévue dans le schéma de base, le rappel hexavalent est réalisé à 12 mois et la dernière dose contre les pneumocoques à 15 mois. Remettez ou montrez les supports actualisés afin de sécuriser les prochains rendez-vous.

Des supports actualisés

Trois supports pour les familles peuvent être utilisés pendant la consultation. Ils reprennent le calendrier 2026-2027 et les rendez-vous vaccinaux des nourrissons.



Calendrier de vaccination 2026-2027
Vue d'ensemble des âges et vaccinations recommandées



À chaque âge sa vaccination !
Dépliant destiné aux parents sur la vaccination entre 2 et 15 mois



Les rendez-vous des vaccins 0-18 mois
Support visuel pour planifier et mémoriser les rendez-vous

Pour aller plus loin

Retrouvez les informations et outils actualisés sur www.vaccination-info.be/pro

Pour l'information destinée aux parents : www.vaccination-info.be

À partir du 1^{er} novembre 2026, pensez « historique - âge - intervalles ». Ces trois vérifications permettent de choisir le schéma approprié et d'assurer la continuité de la protection.